



Table des matières

Cancers -----	2
Cancers actifs-----	6
Cancers sous surveillance -----	10
Cancer du poumon -----	14
Cancer du poumon actif-----	18
Cancer du poumon sous surveillance -----	22
Cancer du sein de la femme -----	26
Cancer du sein de la femme actif-----	30
Cancer du sein de la femme sous surveillance -----	34
Cancer de la prostate -----	38
Cancer de la prostate actif-----	42
Cancer de la prostate sous surveillance -----	46
Cancer du côlon -----	50
Cancer du côlon actif-----	54
Cancer du côlon sous surveillance -----	58
Autres cancers -----	62
Autres cancers actifs -----	66
Autres cancers sous surveillance -----	70




Cancers

Au régime agricole en 2021

Caractéristiques de la population concernée

- Nombre de consommateurs du régime agricole concernés : 199 744
- Evolution moyenne annuelle de 2017 à 2021 : - 0,5 %
- Taux de prévalence : 68,1 ‰
- Âge moyen : 74,9 ans – Âge médian : 77 ans
- Répartition hommes/femmes : 55,3 % / 44,7 %
- Nombre de nouveaux cas en 2021 : 31 013

Taux de prévalence pour 1 000 en 2021, par âge, par sexe et par régime




Source: SNDS



Part des assurés pris en charge pour la pathologie et affectés par une autre pathologie

57,7 % des assurés pris en charge pour *Cancers*, sont atteints d'au moins une de ces pathologies :



Note: une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

Source: SNDS

Indices comparatifs et coût


Régime	Nombre de consommateurs	Indice comparatif*	Significativité	Consommateurs du régime agricole	
				Nombre de consommateurs	Coût au régime agricole
Non-salariés	116 938	88,7	***	199 744	1 471 891 831€
Salariés	82 806	94,6	***		

Source: SNDS

*L'indice comparatif mesure la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Effectifs et taux de prévalence de 2017 à 2021, par régime




Source: SNDS

Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de prévalence par département



Source: SNDS

Indices comparatifs (IC) : Dans les départements représentés en vert, il y a une sous-représentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en orange, il y a une surreprésentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en gris les différences ne sont pas significatives.



Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G10 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes consommant des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- Algorithme de définition – Cancers (sup_Can_cat) :

Regroupement des pathologies cancer du sein de la femme actif, cancer du sein de la femme sous surveillance, cancer du côlon actif, cancer du côlon sous surveillance, cancer du poumon actif, cancer du poumon sous surveillance, cancer de la prostate actif, cancer de la prostate sous surveillance, autres cancers actifs et autres cancers sous surveillance

L'ensemble des algorithmes sont à retrouver ici : [méthode de repérage des pathologies dans la cartographie](#)

- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de consommateurs observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de consommateurs attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe, les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des consommateurs en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Cancers actifs

Au régime agricole en 2021

Caractéristiques de la population concernée

- Nombre de consommateurs du régime agricole concernés : 87 249
- Evolution moyenne annuelle de 2017 à 2021 : - 2,5 %
- Taux de prévalence : 29,7 ‰
- Âge moyen : 73,2 ans – Âge médian : 74 ans
- Répartition hommes/femmes : 59,7 % / 40,3 %
- Nombre de nouveaux cas en 2021 : 34 158

Taux de prévalence pour 1 000 en 2021, par âge, par sexe et par régime




Source: SNDS



Part des assurés pris en charge pour la pathologie et affectés par une autre pathologie

58,1 % des assurés pris en charge pour *Cancers actifs*, sont atteints d'au moins une de ces pathologies :



Note: une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

Source: SNDS

Indices comparatifs et coût

Régime	Nombre de consommateurs	Indice comparatif*	Significativité
Non-salariés	48 771	88,4	***
Salariés	38 478	97,3	***



Consommateurs du régime agricole	
Nombre de consommateurs	Coût au régime agricole
87 249	1 308 652 732€

Source: SNDS

*L'indice comparatif mesure la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Effectifs et taux de prévalence de 2017 à 2021, par régime




Source: SNDS

Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de prévalence par département



Source: SNDS

Indices comparatifs (IC) : Dans les départements représentés en vert, il y a une sous-représentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en orange, il y a une surreprésentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en gris les différences ne sont pas significatives.



Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G10 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes consommant des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- Algorithme de définition – Cancers actifs (sup_CanAct_cat) :

Regroupement des pathologies cancer du sein de la femme actif, cancer du côlon actif, cancer du poumon actif, cancer de la prostate actif et autres cancers actifs

L'ensemble des algorithmes sont à retrouver ici : [méthode de repérage des pathologies dans la cartographie](#)

- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de consommateurs observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de consommateurs attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe, les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des consommateurs en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Cancers sous surveillance

Au régime agricole en 2021

Caractéristiques de la population concernée

- Nombre de consommateurs du régime agricole concernés : 118 640
- Evolution moyenne annuelle de 2017 à 2021 : + 1,1 %
- Taux de prévalence : 40,4 ‰
- Âge moyen : 76,4 ans – Âge médian : 79 ans
- Répartition hommes/femmes : 52,7 % / 47,3 %
- Nombre de nouveaux cas en 2021 : 24 423

Taux de prévalence pour 1 000 en 2021, par âge, par sexe et par régime




Source: SNDS



Part des assurés pris en charge pour la pathologie et affectés par une autre pathologie

57,8 % des assurés pris en charge pour *Cancers sous surveillance*, sont atteints d'au moins une de ces pathologies :



Note: une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

Source: SNDS

Indices comparatifs et coût



Régime	Nombre de consommateurs	Indice comparatif*	Significativité	Consommateurs du régime agricole	
Non-salariés	71 861	88,1	***	Nombre de consommateurs	Coût au régime agricole
Salariés	46 779	92,2	***		
				118 640	163 239 099€

Source: SNDS

*L'indice comparatif mesure la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Effectifs et taux de prévalence de 2017 à 2021, par régime




Source: SNDS

Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de prévalence par département



Source: SNDS

Indices comparatifs (IC) : Dans les départements représentés en vert, il y a une sous-représentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en orange, il y a une surreprésentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en gris les différences ne sont pas significatives.



Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G10 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes consommant des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- Algorithme de définition – Cancers sous surveillance (sup_CanSur_cat) :

Regroupement des pathologies cancer du sein de la femme sous surveillance, cancer du côlon sous surveillance, cancer du poumon sous surveillance, cancer de la prostate sous surveillance et autres cancers sous surveillance

L'ensemble des algorithmes sont à retrouver ici : [méthode de repérage des pathologies dans la cartographie](#)

- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de consommateurs observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de consommateurs attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe, les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des consommateurs en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Cancer du poumon

Au régime agricole en 2021

Caractéristiques de la population concernée

- Nombre de consommateurs du régime agricole concernés : 6 962
- Evolution moyenne annuelle de 2017 à 2021 : + 3 %
- Taux de prévalence : 2,4 ‰
- Âge moyen : 70,8 ans – Âge médian : 71 ans
- Répartition hommes/femmes : 68,7 % / 31,3 %
- Nombre de nouveaux cas en 2021 : 2 102

Taux de prévalence pour 1 000 en 2021, par âge, par sexe et par régime




Source: SNDS



Part des assurés pris en charge pour la pathologie et affectés par une autre pathologie

81,1 % des assurés pris en charge pour *Cancer du poumon*, sont atteints d'au moins une de ces pathologies :



Note: une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

Source: SNDS

*dont 8,9 % Autres cancers actifs ; 7,2 % Autres cancers sous surveillance ; 2,1 % Cancer de la prostate sous surveillance ; 1,6 % Cancer du côlon sous surveillance ; 1,6 % Cancer de la prostate actif ; 1,4 % Cancer du sein de la femme sous surveillance ; 1,2 % Cancer du côlon actif ; 0,9 % Cancer du sein de la femme actif.

Indices comparatifs et coût


Régime	Nombre de consommateurs	Indice comparatif*	Significativité	Consommateurs du régime agricole	
				Nombre de consommateurs	Coût au régime agricole
Non-salariés	2 894	51,0	***	6 962	150 762 443€
Salariés	4 068	91,4	***		

Source: SNDS

*L'indice comparatif mesure la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Effectifs et taux de prévalence de 2017 à 2021, par régime




Source: SNDS

Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de prévalence par département



Source: SNDS

Indices comparatifs (IC) : Dans les départements représentés en vert, il y a une sous-représentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en orange, il y a une surreprésentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en gris les différences ne sont pas significatives.



Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G10 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes consommant des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- Algorithme de définition – Cancer du poumon (sup_CanPoum_cat) :

Regroupement des pathologies cancer du poumon actif et cancer du poumon sous surveillance

L'ensemble des algorithmes sont à retrouver ici : [méthode de repérage des pathologies dans la cartographie](#)

- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de consommateurs observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de consommateurs attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe, les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des consommateurs en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Cancer du poumon actif

Au régime agricole en 2021

Caractéristiques de la population concernée

- Nombre de consommateurs du régime agricole concernés : 4 502
- Evolution moyenne annuelle de 2017 à 2021 : + 2,6 %
- Taux de prévalence : 1,5 ‰
- Âge moyen : 69,5 ans – Âge médian : 69 ans
- Répartition hommes/femmes : 69,3 % / 30,7 %
- Nombre de nouveaux cas en 2021 : 2 094

Taux de prévalence pour 1 000 en 2021, par âge, par sexe et par régime




Source: SNDS



Part des assurés pris en charge pour la pathologie et affectés par une autre pathologie

80,1 % des assurés pris en charge pour *Cancer du poumon actif*, sont atteints d'au moins une de ces pathologies :



Note: une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

Source: SNDS

*dont 10,7 % Autres cancers actifs ; 4,8 % Autres cancers sous surveillance ; 1,7 % Cancer de la prostate sous surveillance ; 1,5 % Cancer de la prostate actif ; 1,5 % Cancer du côlon actif ; 1,1 % Cancer du sein de la femme actif ; 0,9 % Cancer du côlon sous surveillance ; 0,8 % Cancer du sein de la femme sous surveillance ; 0 % Cancer du poumon sous surveillance.

Indices comparatifs et coût


Régime	Nombre de consommateurs	Indice comparatif*	Significativité	Consommateurs du régime agricole	
				Nombre de consommateurs	Coût au régime agricole
Non-salariés	1 792	52,7	***	4 502	143 607 112€
Salariés	2 710	95,5	**		

Source: SNDS

*L'indice comparatif mesure la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Effectifs et taux de prévalence de 2017 à 2021, par régime




Source: SNDS

Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de prévalence par département



Source: SNDS

Indices comparatifs (IC) : Dans les départements représentés en vert, il y a une sous-représentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en orange, il y a une surreprésentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en gris les différences ne sont pas significatives.



Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G10 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes consommant des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- Algorithme de définition – Cancer du poumon actif (top_CanPoum_act) :

Personnes ayant une ALD (Affection de Longue Durée) avec codes CIM-10 de cancer du poumon ou des bronches (y compris les formes in situ) avec date de début au cours des années n à n-1 et/ou personnes hospitalisées pour cancer du poumon ou des bronches au cours des années n à n-1 (diagnostic principal (DP) ou diagnostic relié (DR)). Le cancer actif prime sur le cancer sous surveillance (voir la fiche correspondante). Toutefois, les personnes identifiées comme ayant un cancer du poumon dans le PMSI-MCO au cours des années n à n-1, et repérées uniquement par une hospitalisation pour « examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne » (Z08 en DP ou DR), ont été reclassées dans le groupe surveillance si elles n'ont pas eu au cours des années n à n-1 de séance de radiothérapie (Z51.0) et/ou de chimiothérapie (Z51.1). Un traitement par thérapie ciblée (spécifique des cellules cancéreuses) ou un séjour pour métastase au cours des années n à n-1 conduit à reclasser le patient dans le groupe de cancer actif. En présence d'un autre cancer (autre que de l'encéphale), les séjours pour cancer du poumon sont tous considérés comme liés à une métastase pulmonaire de l'autre cancer

L'ensemble des algorithmes sont à retrouver ici : [méthode de repérage des pathologies dans la cartographie](#)

- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de consommateurs observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de consommateurs attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe, les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des consommateurs en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Cancer du poumon sous surveillance

Au régime agricole en 2021

Caractéristiques de la population concernée

- Nombre de consommateurs du régime agricole concernés : 2 460
- Evolution moyenne annuelle de 2017 à 2021 : + 3,8 %
- Taux de prévalence : 0,8 ‰
- Âge moyen : 73,2 ans – Âge médian : 73 ans
- Répartition hommes/femmes : 67,6 % / 32,4 %
- Nombre de nouveaux cas en 2021 : 635

Taux de prévalence pour 1 000 en 2021, par âge, par sexe et par régime




Source: SNDS



Part des assurés pris en charge pour la pathologie et affectés par une autre pathologie

82,9 % des assurés pris en charge pour *Cancer du poumon sous surveillance*, sont atteints d'au moins une de ces pathologies :



Note: une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

Source: SNDS

*dont 11,6 % Autres cancers sous surveillance ; 5,8 % Autres cancers actifs ; 2,9 % Cancer du côlon sous surveillance ; 2,8 % Cancer de la prostate sous surveillance ; 2,6 % Cancer du sein de la femme sous surveillance ; 1,7 % Cancer de la prostate actif ; 0,7 % Cancer du côlon actif ; 0,6 % Cancer du sein de la femme actif ; 0 % Cancer du poumon actif.

Indices comparatifs et coût


Régime	Nombre de consommateurs	Indice comparatif*	Significativité	Consommateurs du régime agricole	
Non-salariés	1 102	48,6	***	Nombre de consommateurs	Coût au régime agricole
Salariés	1 358	84,2	***	2 460	7 155 331€

Source: SNDS

*L'indice comparatif mesure la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Effectifs et taux de prévalence de 2017 à 2021, par régime




Source: SNDS

Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de prévalence par département



Source: SNDS

Indices comparatifs (IC) : Dans les départements représentés en vert, il y a une sous-représentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en orange, il y a une surreprésentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en gris les différences ne sont pas significatives.



Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G10 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes consommant des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- Algorithme de définition – Cancer du poumon sous surveillance (top_CanPoum_sur) :

Personnes ayant une ALD (Affection de Longue Durée) avec codes CIM-10 de cancer du poumon ou des bronches avec date de début antérieure à l'année n-1, et/ou personnes hospitalisées pour cancer du poumon ou des bronches au cours des années n à n-4 (diagnostic principal (DP) ou diagnostic relié (DR), ou diagnostic associé (DA) au cours des années n à n-1). En présence d'un autre cancer (autre que de l'encéphale), les séjours pour cancer du poumon sont tous considérés comme liés à une métastase pulmonaire de l'autre cancer. Le cancer actif prime sur le cancer sous surveillance (voir la fiche correspondante)


L'ensemble des algorithmes sont à retrouver ici : [méthode de repérage des pathologies dans la cartographie](#)

- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de consommateurs observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de consommateurs attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe, les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des consommateurs en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.



Part des assurés pris en charge pour la pathologie et affectés par une autre pathologie

50,8 % des assurés pris en charge pour *Cancer du sein de la femme*, sont atteints d'au moins une de ces pathologies :



Note: une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

Source: SNDS

*dont 5,5 % Autres cancers sous surveillance ; 3,7 % Autres cancers actifs ; 1,4 % Cancer du côlon sous surveillance ; 0,7 % Cancer du côlon actif ; 0,3 % Cancer du poumon actif ; 0,2 % Cancer du poumon sous surveillance ; 0 % Cancer de la prostate actif ; 0 % Cancer de la prostate sous surveillance.

Indices comparatifs et coût


Régime	Nombre de consommateurs	Indice comparatif*	Significativité	Consommateurs du régime agricole	
Non-salariés	17 798	76,0	***	Nombre de consommateurs	Coût au régime agricole
Salariés	14 774	90,3	***		
				32 572	192 959 864€

Source: SNDS

*L'indice comparatif mesure la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Effectifs et taux de prévalence de 2017 à 2021, par régime




Source: SNDS

Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de prévalence par département



Source: SNDS

Indices comparatifs (IC) : Dans les départements représentés en vert, il y a une sous-représentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en orange, il y a une surreprésentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en gris les différences ne sont pas significatives.



Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G10 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes consommant des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- Algorithme de définition – Cancer du sein de la femme (sup_CanSeiF_cat) :

Regroupement des pathologies cancer du sein de la femme actif et cancer du sein de la femme sous surveillance

L'ensemble des algorithmes sont à retrouver ici : [méthode de repérage des pathologies dans la cartographie](#)

- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de consommateurs observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de consommateurs attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe, les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des consommateurs en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Cancer du sein de la femme actif

Au régime agricole en 2021

Caractéristiques de la population concernée

- Nombre de consommateurs du régime agricole concernés : 9 794
- Evolution moyenne annuelle de 2017 à 2021 : - 2,2 %
- Taux de prévalence : 7,3 ‰
- Âge moyen : 68,4 ans – Âge médian : 69 ans
- Répartition hommes/femmes : 0 % / 100 %
- Nombre de nouveaux cas en 2021 : 4 006

Taux de prévalence pour 1 000 en 2021, par âge, par sexe et par régime




Source: SNDS



Part des assurés pris en charge pour la pathologie et affectés par une autre pathologie

45,4 % des assurés pris en charge pour *Cancer du sein de la femme actif*, sont atteints d'au moins une de ces pathologies :



Note: une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

Source: SNDS

*dont 4,6 % Autres cancers actifs ; 3,6 % Autres cancers sous surveillance ; 0,9 % Cancer du côlon actif ; 0,8 % Cancer du côlon sous surveillance ; 0,5 % Cancer du poumon actif ; 0,1 % Cancer du poumon sous surveillance ; 0 % Cancer du sein de la femme sous surveillance ; 0 % Cancer de la prostate actif ; 0 % Cancer de la prostate sous surveillance.

Indices comparatifs et coût



Régime	Nombre de consommateurs	Indice comparatif*	Significativité	Consommateurs du régime agricole	
Non-salariés	4 618	80,4	***	Nombre de consommateurs	Coût au régime agricole
Salariés	5 176	99,2	Non significatif		
				9 794	157 360 557€

Source: SNDS

*L'indice comparatif mesure la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Effectifs et taux de prévalence de 2017 à 2021, par régime




Source: SNDS

Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de prévalence par département



Source: SNDS

Indices comparatifs (IC) : Dans les départements représentés en vert, il y a une sous-représentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en orange, il y a une surreprésentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en gris les différences ne sont pas significatives.



Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G10 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes consommant des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- Algorithme de définition – Cancer du sein de la femme actif (top_CanSeiF_act) :

Femmes ayant une ALD (Affection de Longue Durée) avec codes CIM-10 de cancer du sein (y compris les formes in situ) avec une date de début au cours des années n à n-1, et/ou femmes hospitalisées pour cancer du sein au cours des années n à n-1 (diagnostic principal (DP) ou diagnostic relié (DR)). Le cancer actif prime sur le cancer sous surveillance (voir la fiche correspondante). Toutefois, les femmes identifiées comme ayant un cancer du sein dans le PMSI-MCO au cours des années n à n-1, et repérées uniquement par une hospitalisation pour « examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne » (Z08 en DP ou DR), ont été reclassées dans le groupe surveillance si elles n'ont pas eu au cours des années n à n-1 de séance de radiothérapie (Z51.0) et/ou de chimiothérapie (Z51.1). Un traitement par thérapie ciblée (spécifique des cellules cancéreuses) ou un séjour pour métastase au cours des années n à n-1 conduit à reclasser la patiente dans le groupe de cancer actif. Les inhibiteurs de l'aromatase et les anti-oestrogènes donnés au long cours en prévention des récives n'ont pas été pris en compte

L'ensemble des algorithmes sont à retrouver ici : [méthode de repérage des pathologies dans la cartographie](#)

- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de consommateurs observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de consommateurs attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe, les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des consommateurs en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Cancer du sein de la femme sous surveillance

Au régime agricole en 2021

Caractéristiques de la population concernée

- Nombre de consommateurs du régime agricole concernés : 22 778
- Evolution moyenne annuelle de 2017 à 2021 : - 0 %
- Taux de prévalence : 17,1 ‰
- Âge moyen : 75,1 ans – Âge médian : 77 ans
- Répartition hommes/femmes : 0 % / 100 %
- Nombre de nouveaux cas en 2021 : 3 494

Taux de prévalence pour 1 000 en 2021, par âge, par sexe et par régime




Source: SNDS



Part des assurés pris en charge pour la pathologie et affectés par une autre pathologie

53,1 % des assurés pris en charge pour *Cancer du sein de la femme sous surveillance*, sont atteints d'au moins une de ces pathologies :



Note: une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

Source: SNDS

*dont 6,3 % Autres cancers sous surveillance ; 3,3 % Autres cancers actifs ; 1,7 % Cancer du côlon sous surveillance ; 0,6 % Cancer du côlon actif ; 0,3 % Cancer du poumon sous surveillance ; 0,2 % Cancer du poumon actif ; 0 % Cancer du sein de la femme actif ; 0 % Cancer de la prostate actif ; 0 % Cancer de la prostate sous surveillance.

Indices comparatifs et coût



Régime	Nombre de consommateurs	Indice comparatif*	Significativité	Consommateurs du régime agricole	
				Nombre de consommateurs	Coût au régime agricole
Non-salariés	13 180	74,5	***	22 778	35 599 307€
Salariés	9 598	86,2	***		

Source: SNDS

*L'indice comparatif mesure la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Effectifs et taux de prévalence de 2017 à 2021, par régime




Source: SNDS

Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de prévalence par département



Source: SNDS

Indices comparatifs (IC) : Dans les départements représentés en vert, il y a une sous-représentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en orange, il y a une surreprésentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en gris les différences ne sont pas significatives.



Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G10 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes consommant des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- Algorithme de définition – Cancer du sein de la femme sous surveillance (top_CanSeiF_sur) :

Femmes ayant une ALD (Affection de Longue Durée) avec codes CIM-10 de cancer du sein (y compris les formes in situ) avec date de début antérieure à l'année n-1, et/ou femmes hospitalisées pour cancer du sein au cours des années n à n-4 (diagnostic principal (DP) ou diagnostic relié (DR), ou diagnostic associé (DA) au cours des années n à n-1). Le cancer actif prime sur le cancer sous surveillance (voir la fiche correspondante)

L'ensemble des algorithmes sont à retrouver ici : [méthode de repérage des pathologies dans la cartographie](#)

- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de consommateurs observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de consommateurs attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe, les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des consommateurs en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Cancer de la prostate

Au régime agricole en 2021

Caractéristiques de la population concernée

- Nombre de consommateurs du régime agricole concernés : 41 975
- Evolution moyenne annuelle de 2017 à 2021 : - 1,1 %
- Taux de prévalence : 26,2 ‰
- Âge moyen : 77,8 ans – Âge médian : 78 ans
- Répartition hommes/femmes : 100 % / 0 %
- Nombre de nouveaux cas en 2021 : 5 182

Taux de prévalence pour 1 000 en 2021, par âge, par sexe et par régime




Source: SNDS



Part des assurés pris en charge pour la pathologie et affectés par une autre pathologie

64,9 % des assurés pris en charge pour *Cancer de la prostate*, sont atteints d'au moins une de ces pathologies :



Note: une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

Source: SNDS

*dont 7,4 % Autres cancers sous surveillance ; 5,9 % Autres cancers actifs ; 2,2 % Cancer du côlon sous surveillance ; 1,1 % Cancer du côlon actif ; 0,3 % Cancer du poumon actif ; 0,3 % Cancer du poumon sous surveillance ; 0 % Cancer du sein de la femme actif ; 0 % Cancer du sein de la femme sous surveillance.

Indices comparatifs et coût



Régime	Nombre de consommateurs	Indice comparatif*	Significativité	Consommateurs du régime agricole	
Non-salariés	26 377	98,4	***	Nombre de consommateurs	Coût au régime agricole
Salariés	15 598	95,4	***		
				41 975	188 983 380€

Source: SNDS

*L'indice comparatif mesure la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Effectifs et taux de prévalence de 2017 à 2021, par régime




Source: SNDS

Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de prévalence par département



Source: SNDS

Indices comparatifs (IC) : Dans les départements représentés en vert, il y a une sous-représentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en orange, il y a une surreprésentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en gris les différences ne sont pas significatives.



Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G10 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes consommant des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- Algorithme de définition – Cancer de la prostate (sup_CanPros_cat) :

Regroupement des pathologies cancer de la prostate actif et cancer de la prostate sous surveillance

L'ensemble des algorithmes sont à retrouver ici : [méthode de repérage des pathologies dans la cartographie](#)

- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de consommateurs observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de consommateurs attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe, les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des consommateurs en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Cancer de la prostate actif

Au régime agricole en 2021

Caractéristiques de la population concernée

- Nombre de consommateurs du régime agricole concernés : 16 130
- Evolution moyenne annuelle de 2017 à 2021 : - 4,3 %
- Taux de prévalence : 10,1 ‰
- Âge moyen : 76,5 ans – Âge médian : 76 ans
- Répartition hommes/femmes : 100 % / 0 %
- Nombre de nouveaux cas en 2021 : 5 517

Taux de prévalence pour 1 000 en 2021, par âge, par sexe et par régime




Source: SNDS



Part des assurés pris en charge pour la pathologie et affectés par une autre pathologie

63 % des assurés pris en charge pour *Cancer de la prostate actif*, sont atteints d'au moins une de ces pathologies :



Note: une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

Source: SNDS

*dont 6,2 % Autres cancers actifs ; 6 % Autres cancers sous surveillance ; 2,1 % Cancer du côlon sous surveillance ; 1,2 % Cancer du côlon actif ; 0,4 % Cancer du poumon actif ; 0,3 % Cancer du poumon sous surveillance ; 0 % Cancer du sein de la femme actif ; 0 % Cancer du sein de la femme sous surveillance ; 0 % Cancer de la prostate sous surveillance.

Indices comparatifs et coût



Régime	Nombre de consommateurs	Indice comparatif*	Significativité	Consommateurs du régime agricole	
Non-salariés	9 934	101,5	Non significatif	Nombre de consommateurs	Coût au régime agricole
Salariés	6 196	96,5	***		
				16 130	157 844 478€

Source: SNDS

*L'indice comparatif mesure la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Effectifs et taux de prévalence de 2017 à 2021, par régime




Source: SNDS

Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de prévalence par département



Source: SNDS

Indices comparatifs (IC) : Dans les départements représentés en vert, il y a une sous-représentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en orange, il y a une surreprésentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en gris les différences ne sont pas significatives.



Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G10 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes consommant des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- Algorithme de définition – Cancer de la prostate actif (top_CanPros_act) :

Hommes ayant une ALD (Affection de Longue Durée) avec codes CIM-10 de cancer de la prostate (y compris les formes in situ) avec date de début au cours des années n à n-1, et/ou hommes hospitalisés pour cancer de la prostate au cours des années n à n-1 (diagnostic principal (DP) ou diagnostic relié (DR)), et/ou hommes âgés de 40 ans et plus, ayant reçu au moins 3 délivrances au cours des années n à n-1 de traitement anti-androgénique. Le cancer actif prime sur le cancer sous surveillance (voir la fiche correspondante). Toutefois, les hommes identifiés comme ayant un cancer de la prostate dans le PMSI-MCO au cours des années n à n-1, et repérés uniquement par une hospitalisation pour « examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne » (Z08 en DP ou DR), ont été reclassés dans le groupe surveillance s'ils n'ont pas eu au cours des années n à n-1 de séance de radiothérapie (Z51.0) et/ou de chimiothérapie (Z51.1). Un traitement par thérapie ciblée (spécifique des cellules cancéreuses) ou un séjour pour métastase au cours des années n à n-1 conduit à reclasser le patient dans le groupe de cancer actif

L'ensemble des algorithmes sont à retrouver ici : [méthode de repérage des pathologies dans la cartographie](#)

- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de consommateurs observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de consommateurs attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe, les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des consommateurs en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Cancer de la prostate sous surveillance

Au régime agricole en 2021

Caractéristiques de la population concernée

- Nombre de consommateurs du régime agricole concernés : 25 845
- Evolution moyenne annuelle de 2017 à 2021 : + 1,1 %
- Taux de prévalence : 16,1 ‰
- Âge moyen : 78,7 ans – Âge médian : 79 ans
- Répartition hommes/femmes : 100 % / 0 %
- Nombre de nouveaux cas en 2021 : 4 571

Taux de prévalence pour 1 000 en 2021, par âge, par sexe et par régime




Source: SNDS



Part des assurés pris en charge pour la pathologie et affectés par une autre pathologie

66,2 % des assurés pris en charge pour *Cancer de la prostate sous surveillance*, sont atteints d'au moins une de ces pathologies :



Note: une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

Source: SNDS

*dont 8,3 % Autres cancers sous surveillance ; 5,7 % Autres cancers actifs ; 2,3 % Cancer du côlon sous surveillance ; 1,1 % Cancer du côlon actif ; 0,3 % Cancer du poumon actif ; 0,3 % Cancer du poumon sous surveillance ; 0 % Cancer du sein de la femme actif ; 0 % Cancer du sein de la femme sous surveillance ; 0 % Cancer de la prostate actif.

Indices comparatifs et coût



Régime	Nombre de consommateurs	Indice comparatif*	Significativité	Consommateurs du régime agricole	
				Nombre de consommateurs	Coût au régime agricole
Non-salariés	16 443	96,6	***	25 845	31 138 901€
Salariés	9 402	94,7	***		

Source: SNDS

*L'indice comparatif mesure la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Effectifs et taux de prévalence de 2017 à 2021, par régime




Source: SNDS

Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de prévalence par département



Source: SNDS

Indices comparatifs (IC) : Dans les départements représentés en vert, il y a une sous-représentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en orange, il y a une surreprésentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en gris les différences ne sont pas significatives.



Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G10 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes consommant des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- Algorithme de définition – Cancer de la prostate sous surveillance (top_CanPros_sur) :

Hommes ayant une ALD (Affection de Longue Durée) avec codes CIM-10 de cancer de la prostate avec date de début antérieure à l'année n-1, et/ou hommes hospitalisés pour cancer de la prostate au cours des années n à n-4 (diagnostic principal (DP) ou diagnostic relié (DR), ou diagnostic associé (DA) au cours des années n à n-1). Le cancer actif prime sur le cancer sous surveillance (voir la fiche correspondante)

L'ensemble des algorithmes sont à retrouver ici : [méthode de repérage des pathologies dans la cartographie](#)

- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de consommateurs observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de consommateurs attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe, les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des consommateurs en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Cancer du côlon

Au régime agricole en 2021

Caractéristiques de la population concernée

- Nombre de consommateurs du régime agricole concernés : 24 828
- Evolution moyenne annuelle de 2017 à 2021 : - 1,7 %
- Taux de prévalence : 8,5 ‰
- Âge moyen : 77,3 ans – Âge médian : 79 ans
- Répartition hommes/femmes : 56,8 % / 43,2 %
- Nombre de nouveaux cas en 2021 : 4 001

Taux de prévalence pour 1 000 en 2021, par âge, par sexe et par régime




Source: SNDS



Part des assurés pris en charge pour la pathologie et affectés par une autre pathologie

67,8 % des assurés pris en charge pour *Cancer du côlon*, sont atteints d'au moins une de ces pathologies :



Note: une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

Source: SNDS

*dont 8,8 % Autres cancers sous surveillance ; 7,2 % Autres cancers actifs ; 3,5 % Cancer de la prostate sous surveillance ; 2,1 % Cancer de la prostate actif ; 2,1 % Cancer du sein de la femme sous surveillance ; 0,7 % Cancer du sein de la femme actif ; 0,4 % Cancer du poumon actif ; 0,4 % Cancer du poumon sous surveillance.

Indices comparatifs et coût



Régime	Nombre de consommateurs	Indice comparatif*	Significativité	Consommateurs du régime agricole	
Non-salariés	15 239	91,3	***	Nombre de consommateurs	Coût au régime agricole
Salariés	9 589	98,1	*		
				24 828	130 741 457€

Source: SNDS

*L'indice comparatif mesure la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Effectifs et taux de prévalence de 2017 à 2021, par régime




Source: SNDS

Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de prévalence par département



Source: SNDS

Indices comparatifs (IC) : Dans les départements représentés en vert, il y a une sous-représentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en orange, il y a une surreprésentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en gris les différences ne sont pas significatives.



Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G10 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes consommant des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- Algorithme de définition – Cancer du côlon (sup_CanColo_cat) :

Regroupement des pathologies cancer du côlon actif et cancer du côlon sous surveillance

L'ensemble des algorithmes sont à retrouver ici : [méthode de repérage des pathologies dans la cartographie](#)

- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de consommateurs observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de consommateurs attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe, les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des consommateurs en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Cancer du côlon actif

Au régime agricole en 2021

Caractéristiques de la population concernée

- Nombre de consommateurs du régime agricole concernés : 8 776
- Evolution moyenne annuelle de 2017 à 2021 : - 5,4 %
- Taux de prévalence : 3 ‰
- Âge moyen : 74,1 ans – Âge médian : 75 ans
- Répartition hommes/femmes : 59,9 % / 40,1 %
- Nombre de nouveaux cas en 2021 : 3 868

Taux de prévalence pour 1 000 en 2021, par âge, par sexe et par régime




Source: SNDS



Part des assurés pris en charge pour la pathologie et affectés par une autre pathologie

66,9 % des assurés pris en charge pour *Cancer du côlon actif*, sont atteints d'au moins une de ces pathologies :



Note: une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

Source: SNDS

*dont 10,4 % Autres cancers actifs ; 7,4 % Autres cancers sous surveillance ; 3,2 % Cancer de la prostate sous surveillance ; 2,2 % Cancer de la prostate actif ; 1,6 % Cancer du sein de la femme sous surveillance ; 1,1 % Cancer du sein de la femme actif ; 0,8 % Cancer du poumon actif ; 0,2 % Cancer du poumon sous surveillance ; 0 % Cancer du côlon sous surveillance.

Indices comparatifs et coût



Régime	Nombre de consommateurs	Indice comparatif*	Significativité	Consommateurs du régime agricole	
Non-salariés	5 037	91,1	***	Nombre de consommateurs	Coût au régime agricole
Salariés	3 739	100,0	Non significatif		
				8 776	110 825 921€

Source: SNDS

*L'indice comparatif mesure la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Effectifs et taux de prévalence de 2017 à 2021, par régime




Source: SNDS

Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de prévalence par département



Source: SNDS

Indices comparatifs (IC) : Dans les départements représentés en vert, il y a une sous-représentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en orange, il y a une surreprésentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en gris les différences ne sont pas significatives.



Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G10 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes consommant des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- Algorithme de définition – Cancer du côlon actif (top_CanColo_act) :

Personnes ayant une ALD (Affection de Longue Durée) avec codes CIM-10 de cancer du côlon, de la jonction recto-sigmoïdienne ou du rectum (y compris les formes in situ) avec date de début au cours des années n à n-1, et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs au cours des années n à n-1 (diagnostic principal (DP) ou diagnostic relié (DR)). Le cancer actif prime sur le cancer sous surveillance (voir la fiche correspondante). Toutefois, les personnes identifiées comme ayant un cancer du côlon dans le PMSI-MCO au cours des années n à n-1, et repérées uniquement par une hospitalisation pour « examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne » (Z08 en DP ou DR), ont été reclassées dans le groupe surveillance si elles n'ont pas eu au cours des années n à n-1 de séance de radiothérapie (Z51.0) et/ou de chimiothérapie (Z51.1). Un traitement par thérapie ciblée (spécifique des cellules cancéreuses) ou un séjour pour métastase au cours des années n à n-1 conduit à reclasser la personne dans le groupe de cancer actif

L'ensemble des algorithmes sont à retrouver ici : [méthode de repérage des pathologies dans la cartographie](#)

- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de consommateurs observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de consommateurs attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe, les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des consommateurs en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Cancer du côlon sous surveillance

Au régime agricole en 2021

Caractéristiques de la population concernée

- Nombre de consommateurs du régime agricole concernés : 16 052
- Evolution moyenne annuelle de 2017 à 2021 : + 0,6 %
- Taux de prévalence : 5,5 ‰
- Âge moyen : 79 ans – Âge médian : 82 ans
- Répartition hommes/femmes : 55,1 % / 44,9 %
- Nombre de nouveaux cas en 2021 : 3 062

Taux de prévalence pour 1 000 en 2021, par âge, par sexe et par régime




Source: SNDS



Part des assurés pris en charge pour la pathologie et affectés par une autre pathologie

68,3 % des assurés pris en charge pour *Cancer du côlon sous surveillance*, sont atteints d'au moins une de ces pathologies :



Note: une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

Source: SNDS

*dont 9,5 % Autres cancers sous surveillance ; 5,4 % Autres cancers actifs ; 3,8 % Cancer de la prostate sous surveillance ; 2,3 % Cancer du sein de la femme sous surveillance ; 2,1 % Cancer de la prostate actif ; 0,5 % Cancer du sein de la femme actif ; 0,4 % Cancer du poumon sous surveillance ; 0,2 % Cancer du poumon actif ; 0 % Cancer du côlon actif.

Indices comparatifs et coût



Régime	Nombre de consommateurs	Indice comparatif*	Significativité	Consommateurs du régime agricole	
				Nombre de consommateurs	Coût au régime agricole
Non-salariés	10 202	91,5	***	16 052	19 915 536€
Salariés	5 850	97,0	**		

Source: SNDS

*L'indice comparatif mesure la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Effectifs et taux de prévalence de 2017 à 2021, par régime




Source: SNDS

Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de prévalence par département



Source: SNDS

Indices comparatifs (IC) : Dans les départements représentés en vert, il y a une sous-représentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en orange, il y a une surreprésentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en gris les différences ne sont pas significatives.



Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G10 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes consommant des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- Algorithme de définition – Cancer du côlon sous surveillance (top_CanColo_sur) :

Personnes ayant une ALD (Affection de Longue Durée) avec codes CIM-10 de cancer du côlon, de la jonction recto-sigmoïdienne ou du rectum (y compris les formes in situ) avec date de début antérieure à l'année n-1, et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs au cours des années n à n-4 (diagnostic principal (DP) ou diagnostic relié (DR), ou diagnostic associé (DA) au cours des années n à n-1). Le cancer actif prime sur le cancer sous surveillance (voir la fiche correspondante)

L'ensemble des algorithmes sont à retrouver ici : [méthode de repérage des pathologies dans la cartographie](#)

- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de consommateurs observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de consommateurs attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe, les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des consommateurs en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Autres cancers

Au régime agricole en 2021

Caractéristiques de la population concernée

- Nombre de consommateurs du régime agricole concernés : 109 232
- Evolution moyenne annuelle de 2017 à 2021 : - 0,1 %
- Taux de prévalence : 37,2 ‰
- Âge moyen : 74,6 ans – Âge médian : 77 ans
- Répartition hommes/femmes : 54,7 % / 45,3 %
- Nombre de nouveaux cas en 2021 : 20 019

Taux de prévalence pour 1 000 en 2021, par âge, par sexe et par régime




Source: SNDS



Part des assurés pris en charge pour la pathologie et affectés par une autre pathologie

64,1 % des assurés pris en charge pour *Autres cancers*, sont atteints d'au moins une de ces pathologies :



Note: une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

Source: SNDS

*dont 3,3 % Cancer de la prostate sous surveillance ; 2,2 % Cancer du côlon sous surveillance ; 2 % Cancer du sein de la femme sous surveillance ; 1,8 % Cancer de la prostate actif ; 1,4 % Cancer du côlon actif ; 0,7 % Cancer du sein de la femme actif ; 0,6 % Cancer du poumon actif ; 0,4 % Cancer du poumon sous surveillance.

Indices comparatifs et coût


Régime	Nombre de consommateurs	Indice comparatif*	Significativité	Consommateurs du régime agricole	
				Nombre de consommateurs	Coût au régime agricole
Non-salariés	64 109	89,2	***	109 232	808 444 687€
Salariés	45 123	94,7	***		

Source: SNDS

*L'indice comparatif mesure la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Effectifs et taux de prévalence de 2017 à 2021, par régime




Source: SNDS

Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de prévalence par département



Source: SNDS

Indices comparatifs (IC) : Dans les départements représentés en vert, il y a une sous-représentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en orange, il y a une surreprésentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en gris les différences ne sont pas significatives.



Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G10 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes consommant des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- Algorithme de définition – Autres cancers (sup_CanAutr_cat) :

Regroupement des pathologies autres cancers actifs et autres cancers sous surveillance

L'ensemble des algorithmes sont à retrouver ici : [méthode de repérage des pathologies dans la cartographie](#)

- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de consommateurs observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de consommateurs attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe, les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des consommateurs en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Autres cancers actifs

Au régime agricole en 2021

Caractéristiques de la population concernée

- Nombre de consommateurs du régime agricole concernés : 51 300
- Evolution moyenne annuelle de 2017 à 2021 : - 1,9 %
- Taux de prévalence : 17,5 ‰
- Âge moyen : 73,4 ans – Âge médian : 75 ans
- Répartition hommes/femmes : 58 % / 42 %
- Nombre de nouveaux cas en 2021 : 20 904

Taux de prévalence pour 1 000 en 2021, par âge, par sexe et par régime




Source: SNDS



Part des assurés pris en charge pour la pathologie et affectés par une autre pathologie

64,5 % des assurés pris en charge pour *Autres cancers actifs*, sont atteints d'au moins une de ces pathologies :



Note: une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

Source: SNDS

*dont 2,9 % Cancer de la prostate sous surveillance ; 2 % Cancer de la prostate actif ; 1,8 % Cancer du côlon actif ; 1,7 % Cancer du côlon sous surveillance ; 1,5 % Cancer du sein de la femme sous surveillance ; 0,9 % Cancer du poumon actif ; 0,9 % Cancer du sein de la femme actif ; 0,3 % Cancer du poumon sous surveillance ; 0 % Autres cancers sous surveillance.

Indices comparatifs et coût



Régime	Nombre de consommateurs	Indice comparatif*	Significativité	Consommateurs du régime agricole	
				Nombre de consommateurs	Coût au régime agricole
Non-salariés	29 159	88,2	***	51 300	739 014 663€
Salariés	22 141	96,6	***		

Source: SNDS

*L'indice comparatif mesure la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Effectifs et taux de prévalence de 2017 à 2021, par régime




Source: SNDS

Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de prévalence par département



Source: SNDS

Indices comparatifs (IC) : Dans les départements représentés en vert, il y a une sous-représentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en orange, il y a une surreprésentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en gris les différences ne sont pas significatives.



Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G10 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes consommant des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- Algorithme de définition – Autres cancers actifs (top_CanAutr_act) :

Personnes ayant une ALD (Affection de Longue Durée) avec codes CIM-10 d'autres cancers (à l'exclusion des cancers du sein chez la femme, du côlon, de la jonction recto-sigmoïdienne, du rectum, du poumon, des bronches, de la prostate et des tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue) avec date de début au cours des années n à n-1, et/ou personnes hospitalisées pour autres cancers au cours des années n à n-1 (diagnostic principal (DP) ou diagnostic relié (DR)), et hommes atteints de cancers du sein. Le cancer actif prime sur le cancer sous surveillance (voir la fiche correspondante). Toutefois, les personnes identifiées comme ayant un autre cancer dans le PMSI-MCO au cours des années n à n-1, et repérées uniquement par une hospitalisation pour « examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne » (Z08 en DP ou DR), ont été reclassées dans le groupe surveillance si elles n'ont pas eu au cours des années n à n-1 de séance de radiothérapie (Z51.0) et/ou de chimiothérapie (Z51.1). Un traitement par thérapie ciblée (spécifique des cellules cancéreuses) ou un séjour pour métastase au cours des années n à n-1 conduit à reclasser le patient dans le groupe de cancer actif. En présence d'un autre cancer et de séjours pour métastases, certains séjours dont le codage indique un cancer primitif du foie, de l'os et du cerveau ont été considérés comme liés à une métastase hépatique, osseuse ou cérébrale de l'autre cancer

L'ensemble des algorithmes sont à retrouver ici : [méthode de repérage des pathologies dans la cartographie](#)

- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de consommateurs observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de consommateurs attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe, les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des consommateurs en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Autres cancers sous surveillance

Au régime agricole en 2021

Caractéristiques de la population concernée

- Nombre de consommateurs du régime agricole concernés : 57 932
- Evolution moyenne annuelle de 2017 à 2021 : + 1,7 %
- Taux de prévalence : 19,7 ‰
- Âge moyen : 75,7 ans – Âge médian : 79 ans
- Répartition hommes/femmes : 51,8 % / 48,2 %
- Nombre de nouveaux cas en 2021 : 14 864

Taux de prévalence pour 1 000 en 2021, par âge, par sexe et par régime




Source: SNDS



Part des assurés pris en charge pour la pathologie et affectés par une autre pathologie

63,8 % des assurés pris en charge pour *Autres cancers sous surveillance*, sont atteints d'au moins une de ces pathologies :



Note: une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

Source: SNDS

*dont 3,7 % Cancer de la prostate sous surveillance ; 2,6 % Cancer du côlon sous surveillance ; 2,5 % Cancer du sein de la femme sous surveillance ; 1,7 % Cancer de la prostate actif ; 1,1 % Cancer du côlon actif ; 0,6 % Cancer du sein de la femme actif ; 0,5 % Cancer du poumon sous surveillance ; 0,4 % Cancer du poumon actif ; 0 % Autres cancers actifs.

Indices comparatifs et coût



Régime	Nombre de consommateurs	Indice comparatif*	Significativité	Consommateurs du régime agricole	
				Nombre de consommateurs	Coût au régime agricole
Non-salariés	34 950	90,1	***	57 932	69 430 023€
Salariés	22 982	93,0	***		

Source: SNDS

*L'indice comparatif mesure la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.




Effectifs et taux de prévalence de 2017 à 2021, par régime




Source: SNDS

Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de prévalence par département



Source: SNDS

Indices comparatifs (IC) : Dans les départements représentés en vert, il y a une sous-représentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en orange, il y a une surreprésentation des assurés du régime agricole ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en gris les différences ne sont pas significatives.



Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G10 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes consommant des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- Algorithme de définition – Autres cancers sous surveillance (top_CanAutr_sur) :

Personnes ayant une ALD (Affection de Longue Durée) avec codes CIM-10 d'autres cancers (à l'exclusion des cancers du sein chez la femme, du côlon, de la jonction recto-sigmoïdienne, du rectum, du poumon, des bronches, de la prostate et des tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue) avec date de début antérieure à l'année n-1, et/ou personnes hospitalisées pour autres cancers au cours des années n à n-4 (diagnostic principal (DP) ou diagnostic relié (DR), ou diagnostic associé (DA) au cours des années n à n-1). Les patients de sexe masculin atteints de cancers du sein sont inclus dans ce groupe. Le cancer actif prime sur le cancer sous surveillance (voir la fiche correspondante)

L'ensemble des algorithmes sont à retrouver ici : [méthode de repérage des pathologies dans la cartographie](#)

- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de consommateurs observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de consommateurs attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe, les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des consommateurs en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.