Table des matières

Traitements du risque vasculaire (hors pathologies) ---------- 2
Traitements antihypertenseurs (hors pathologies) ---------- 7
Traitements hypolipémiants (hors pathologies) ---------- 12

Traitements du risque vasculaire (hors pathologies)

Au régime agricole en 2024


Caractéristiques de la population concernée

- Nombre de patients concernés (prévalence) : 513 064
  - Evolution moyenne annuelle de 2020 à 2024 : - 1,2 %
- Taux de prévalence : 184,0 patient pour 1 000
- Nombre de nouveaux cas en 2024 (incidence) : 62 050

- Âge moyen : 71,7 ans – Âge médian : 73 ans
- Répartition hommes / femmes : 47,8 % / 52,2 %
- Répartition salariés agricoles / non-salariés agricoles : 46,9 % / 53,1 %


- Coût : 477 532 869 €, soit 4,4 % de la dépense total du régime agricole

Taux d'incidence pour 1 000 en 2024, par âge, par sexe et par régime



Source SNDS : Exploitation MSA

Taux de prévalence pour 1 000 en 2024, par âge, par sexe et par régime




Source SNDS : Exploitation MSA


Indice comparatif du taux de prévalence : *surreprésentation (> 100) ou sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie par rapport aux patients de l'ensemble des régimes*

Sexe	Régime	Nombre de consommants	Indice comparatif	Significativité
Femmes	Non-salariées	148 629	105,8	***
	Salariées	118 951	99,1	***
	Total	**267 580**	**102,7**	***
Hommes	Non-salariés	124 062	107,1	***
	Salariés	121 422	101,7	***
	Total	**245 484**	**104,4**	***
Total	Non-salariés	272 691	106,4	***
	Salariés	240 373	100,4	**
	Total	**513 064**	**103,5**	***

Source SNDS : Exploitation MSA

Effectifs et taux de prévalence de 2020 à 2024, par régime






Source SNDS : Exploitation MSA


Précautions d'interprétation : *L'effectif correspond au nombre d'assurés concernés. Son évolution est en partie liée à la structure démographique du régime agricole.*

Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif du taux de prévalence par département




Source SNDS : Exploitation MSA

Clé de lecture des indices comparatifs (IC) par département :
Vert foncé / Vert clair : sous-représentation des assurés du régime agricole (RA) ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Gris : différences non significatives. Orange / Rouge : surreprésentation des assurés du RA ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département.

Part des assurés identifiés comme utilisant ce traitement et affectés par une autre pathologie

43,6 % des assurés pris en charge pour *Traitements du risque vasculaire (hors pathologies)*, sont atteints d'au moins une de ces pathologies :



Note: une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

Source SNDS :Exploitation MSA

Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G13 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes patients des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- L'algorithme détaillé de la pathologie : Traitements du risque vasculaire (hors pathologies) (TFC_CAT_EXC) : est à retrouver ici : méthode de repérage des pathologies dans la cartographie
- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de patients observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de patients attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe,

les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des patients en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux patients de soins de l'ensemble des régimes.

Traitements antihypertenseurs (hors pathologies)

Au régime agricole en 2024


Caractéristiques de la population concernée

- Nombre de patients concernés (prévalence) : 440 916
  - Evolution moyenne annuelle de 2020 à 2024 : - 1,8 %
- Taux de prévalence : 158,2 patient pour 1 000
- Nombre de nouveaux cas en 2024 (incidence) : 51 822

- Âge moyen : 72,4 ans – Âge médian : 74 ans
- Répartition hommes / femmes : 47,2 % / 52,8 %
- Répartition salariés agricoles / non-salariés agricoles : 45,7 % / 54,3 %


- Coût : 349 008 242 €, soit 3,2 % de la dépense total du régime agricole

Taux d'incidence pour 1 000 en 2024, par âge, par sexe et par régime



Source SNDS : Exploitation MSA

Taux de prévalence pour 1 000 en 2024, par âge, par sexe et par régime




Source SNDS : Exploitation MSA


Indice comparatif du taux de prévalence : *surreprésentation (> 100) ou sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie par rapport aux patients de l'ensemble des régimes*

Sexe	Régime	Nombre de consommants	Indice comparatif	Significativité
Femmes	Non-salariées	133 102	107,7	***
	Salariées	99 789	99,7	Non significatif
	Total	**232 891**	**104,1**	***
Hommes	Non-salariés	106 286	107,8	***
	Salariés	101 739	101,9	***
	Total	**208 025**	**104,8**	***
Total	Non-salariés	239 388	107,7	***
	Salariés	201 528	100,8	***
	Total	**440 916**	**104,4**	***

Source SNDS : Exploitation MSA

Effectifs et taux de prévalence de 2020 à 2024, par régime






Source SNDS : Exploitation MSA


Précautions d'interprétation : *L'effectif correspond au nombre d'assurés concernés. Son évolution est en partie liée à la structure démographique du régime agricole.*

Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif du taux de prévalence par département




Source SNDS : Exploitation MSA

Clé de lecture des indices comparatifs (IC) par département :
Vert foncé / Vert clair : sous-représentation des assurés du régime agricole (RA) ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Gris : différences non significatives. Orange / Rouge : surreprésentation des assurés du RA ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département.

Part des assurés identifiés comme utilisant ce traitement et affectés par une autre pathologie

62,1 % des assurés pris en charge pour *Traitements antihypertenseurs (hors pathologies)*, sont atteints d'au moins une de ces pathologies :



Note: une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

Source SNDS :Exploitation MSA

Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G13 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes patients des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- L'algorithme détaillé de la pathologie : Traitements antihypertenseurs (hors pathologies) (TFC_HTA_EXC) : est à retrouver ici : méthode de repérage des pathologies dans la cartographie
- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de patients observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de patients attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe,

les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des patients en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux patients de soins de l'ensemble des régimes.

Traitements hypolipémiants (hors pathologies)

Au régime agricole en 2024


Caractéristiques de la population concernée

- Nombre de patients concernés (prévalence) : 211 183
  - Evolution moyenne annuelle de 2020 à 2024 : + 2,2 %
- Taux de prévalence : 75,7 patients pour 1 000
- Nombre de nouveaux cas en 2024 (incidence) : 34 925

- Âge moyen : 71,9 ans – Âge médian : 73 ans
- Répartition hommes / femmes : 50,0 % / 50,0 %
- Répartition salariés agricoles / non-salariés agricoles : 48,2 % / 51,8 %


- Coût : 128 524 627 €, soit 1,2 % de la dépense total du régime agricole

Taux d'incidence pour 1 000 en 2024, par âge, par sexe et par régime



Source SNDS : Exploitation MSA

Taux de prévalence pour 1 000 en 2024, par âge, par sexe et par régime




Source SNDS : Exploitation MSA


Indice comparatif du taux de prévalence : *surreprésentation (> 100) ou sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie par rapport aux patients de l'ensemble des régimes*

Sexe	Régime	Nombre de consommants	Indice comparatif	Significativité
Femmes	Non-salariées	56 966	101,9	***
	Salariées	48 562	98,8	***
	Total	**105 528**	**100,4**	**Non significatif**
Hommes	Non-salariés	52 403	101,6	***
	Salariés	53 252	101,6	***
	Total	**105 655**	**101,6**	***
Total	Non-salariés	109 369	101,8	***
	Salariés	101 814	100,3	Non significatif
	Total	**211 183**	**101,0**	***

Source SNDS : Exploitation MSA

Effectifs et taux de prévalence de 2020 à 2024, par régime






Source SNDS : Exploitation MSA


Précautions d'interprétation : *L'effectif correspond au nombre d'assurés concernés. Son évolution est en partie liée à la structure démographique du régime agricole.*

Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif du taux de prévalence par département




Source SNDS : Exploitation MSA

Clé de lecture des indices comparatifs (IC) par département :
Vert foncé / Vert clair : sous-représentation des assurés du régime agricole (RA) ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département. Gris : différences non significatives. Orange / Rouge : surreprésentation des assurés du RA ayant la pathologie par rapport à l'ensemble de la population du département.

Part des assurés identifiés comme utilisant ce traitement et affectés par une autre pathologie

77,5 % des assurés pris en charge pour *Traitements hypolipémiants (hors pathologies)*, sont atteints d'au moins une de ces pathologies :



Note: une personne peut être atteinte par plusieurs pathologies (prévalences non sommables)

Source SNDS :Exploitation MSA

Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G13 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes patients des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- L'algorithme détaillé de la pathologie : Traitements hypolipémiants (hors pathologies) (TFC_LIP_EXC) : est à retrouver ici : méthode de repérage des pathologies dans la cartographie
- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de patients observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de patients attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe,

les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des patients en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux patients de soins de l'ensemble des régimes.